

Barómetro del dolor crónico asociado a la migraña

Análisis de situación del impacto del dolor crónico asociado a la migraña en España

Octubre 2024



Avalado por:




FUENTE: Fundación Grünenthal y Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz

31,5%
de pacientes con dolor crónico que padecen migraña




PREVALENCIA DE MIGRAÑA EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO POR SEXO



7,7 Duración media dolor años

7,2 Intensidad media dolor puntos


PREVALENCIA DE MIGRAÑA EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO POR GRUPOS DE EDAD




Información obtenida a partir de encuestas a población de 18 a 85 años residente en España (n=7.058), 6.394 encuestas online a individuos de 18 a 75 años (Computer-Assisted Web Interviewing, CAWI), 664 encuestas telefónicas a individuos de 76 a 85 años (Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI).

Los datos fueron obtenidos en el año 2022 y se presentan en el informe "Barómetro del dolor crónico asociado a la migraña", publicado en 2024.


INTENSIDAD DEL DOLOR CRÓNICO ASOCIADO A LA MIGRAÑA



Localizaciones del dolor crónico asociado a la migraña




Dificultades en las actividades diarias para los pacientes con migraña y dolor crónico




Servicios sanitarios utilizados por los pacientes con migraña y dolor crónico

51% han acudido a servicios sanitarios en el ÚLTIMO MES | **11,3** ESPERA MEDIA en la Unidad del Dolor meses

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO



UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA Y COMORBILIDADES



REGIONES CON MAYOR PREVALENCIA DE MIGRAÑA EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO




Bajas laborales a causa del dolor crónico asociado a la migraña



En el último año ha recibido una baja laboral el

37,3%



● Deja el trabajo ● Mantiene su ocupación ● Cambia de puesto

4,3 meses DURACIÓN MEDIA de la baja laboral

Comorbilidades asociadas a la migraña

