Barómetro del dolor crónico asociado a la artrosis



FUENTE: Fundación Grünenthal y Observatorio

del Dolor de la Universidad de Cádiz




Avalado por:





Análisis de situación del impacto del dolor crónico asociado a la artrosis en España

Julio 2025











PREVALENCIA DE ARTROSIS EN PACIENTES CON **DOLOR CRÓNICO POR GRUPOS DE EDAD**




Información obtenida a partir de encuestas a población de 18 a 85 años residente en España (n=7.058), 6.394 encuestas online a individuos de 18 a 75 años (Computer-Assisted Web Interviewing, CAWI), 664 encuestas telefónicas a individuos de 76 a 85 años (Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI).

Los datos fueron obtenidos en el año 2022 y se presentan en el informe "Barómetro del dolor crónico asociado a la artrosis", publicado en 2025.

Localizaciones del dolor crónico asociado a la artrosis



Dificultades en las actividades diarias para los pacientes con artrosis y dolor crónico



Servicios sanitarios utilizados por los pacientes con artrosis y dolor crónico

servicios sanitarios en el ÚLTIMO MES 10,2 ESPERA MEDIA en la Unidad

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

Atención Primaria - 85,7 %	
Atención Especializada - 71,3%	
Urgencias - 43,0%	
Atención Hospitalaria - 27,5%	

UTILIZACIÓN DE ATENCIÓN **ESPECIALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS Y COMORBILIDADES**

Fisioterapia - 37,2%	
Rehabilitación - 34,9 %	
Reumatología - 34,5 %	
Medicina Interna - 34,1 %	
Unidad del Dolor - 29,1 %	

Neurocirugía - 14,3%

Neurología - 22,9%

Traumatología - 57,4%


Oncología - 7,0%

Bajas laborales a causa del dolor crónico asociado a la artrosis



En el último año ha recibido una baja laboral el

26,4%





Cambia de puesto

Mantiene su

ocupación

DURACIÓN MEDIA de la baja laboral

Comorbilidades asociadas a la artrosis



Lumbalgia 68,2%



Dolor cervical 56,2%



Hombro doloroso

39,5%

Artritis reumatoide



Ciática 34,2%

34,8%



Migraña 28,2%



Desconoce la causa 25.0%



Síndrome del Síndrome del túnel carpiano 18,1%

